

HIV - AIDS
Hakkında Bilgiler

Güvenli Cinsellik



TAPV

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Cinsellik, yaşamın normal ve sağlıklı bir parçasıdır. Cinselliği deneyimlemek tümüyle sizin özgür seçiminize kalmıştır. Bu seçimden bağımsız olarak, cinsel sağlığınız konusunda bilgi sahibi olmak ise sorumlu ve koruyucu davranışları benimsemeyi, mutlu, güvenli ve sağlıklı yaşamınızı sağlayacaktır. Cinsel sağlık, insanın sadece bedensel değil, düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü sağlayan; kişilik gelişimini, iletişimi ve sevginin paylaşımını olumlu yönde zenginleştiren ve arttıran sağlık halidir.

Hayatın pek çok alanında olduğu gibi, cinsel sağlığınızı korumak için de haklarınız ve bu haklarla gelen birtakım sorumluluklarınız olduğunu unutmayın!

Güvenli cinsellik, kişinin cinsel yaşamını istemeyen gebeliklerden, cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan korunarak; güç kullanma, şiddet ve ayrımcılık olmadan, duygusal ve sosyal açıdan zarar görmeden sürdürmesi demektir.

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar hakkında bilgi sahibi olmak ve koruyucu tutum geliştirmek, güvenli ve doyumlu bir cinsel yaşam yolunda atacağınız önemli bir adımdır.



- Cinsel sađlık konusunda kapsamlı ve dođru bilgiye ulařabilmek,
- Cinselliđinizi kendi deđer ve sınırlarınızla uyumlu bir řekilde özgürce yařayabilmek,
- Kendinizi istenmeyen gebelikten ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlardan (CYAE) koruyabilmek,
- Kondomsuz cinsel iliřkiye "Hayır" diyebilmek,
- Mutlu ve doyumlu bir cinsel yařama sahip olmak,
- İliřki sınırlarınız, seřimleriniz ve verdiđiniz kararlardan ötürü üzerinizde baskı hissetmemek,
- İstemediđiniz cinsel davranıřlara "Hayır" diyebilmek ve bunlara maruz kalmamak,

sizin hakkınızdır.

Güvenli Cinsellikte Partnerler:

- İstek ve sınırlarını açık ve baskıdan uzak biçimde ifade eder.
- Birbirlerinin bedenine, duygularına ve sınırlarına saygı gösterir.
- Açık, dürüst ve saygılı iletişim kurar.
- Birbirlerinin fiziksel ve duygusal iyilik hâlini gözetir.
- Karřılıklı onaya (rıza) dayalı hareket eder.
- Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara ve istenmeyen gebeliklere karřı korunmayı önemser.
- Korunmanın hem ortak hem bireysel bir sorumluluk olduđunu bilir.

Sadece evet, evet demektir!

Onay/Rıza: Bir kiřinin belirli bir davranıřı kendi özgür iradesiyle, açıkça ve net bir řekilde kabul ettiđini belirtmesi ya da göstermesidir. Kiři bir ya da birden çok kez onay verdiđi eylemlere artık onay vermeme hakkına her zaman sahiptir.

Unutulmamalıdır ki; onay her an geri çekilebilir ve geçmiřte verilmiř olması gelecekte de geđerli olduđu anlamına gelmez.

CİNSEL YOLLA AKTARILAN ENFEKSİYONLAR (CYAE)

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, bir kişiden diğerine cinsel ilişki yoluyla aktarılabilen enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar yaygın olarak 'Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE)' olarak ifade edilmektedir. Ancak bu yayında, damgalayıcı olmayan dil kullanımını desteklemek amacıyla "Cinsel Yolla Aktarılan Enfeksiyonlar (CYAE)" terimi kullanılmıştır. En sık görülen CYAE'ler bel soğukluğu, klamidyal enfeksiyonlar, frengi, trikomonas, yumuşak çiban, genital uçuk, genital siğiller, HPV enfeksiyonu, HIV enfeksiyonu, Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonudur. Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonların bazıları, özellikle de HIV, frengi, bel soğukluğu gebelik ve doğum sırasında anneden bebeğe geçebilir. Bunun yanı sıra kan ürünleri ve doku transferi ile de geçiş mümkündür.

Nasıl aktarılır?

Hastalıklara neden olan etkenler; kanda, vajinal salgıda, menide, ön sıvılarda ve anne sütünde bulunur. Cinsel yolla, kan yoluyla veya anneden bebeğe geçiş ile yayılabilirler. Cinsel ilişki sırasında CYAE geçişi olması için kan veya cinsel sıvı teması ya da cinsel organ teması gerekmektedir. Cinsel sıvılar, cinsel aktivite sırasında ve sonrasında penis ve vajinadan gelen tüm sıvılardır. Enfeksiyon geçişinin söz konusu olması için enfekte olmuş sıvının başka birinin vücuduna bulaşması gerekir.

CYAE nasıl aktarılabilir?

- Test edilmemiş kan ve kan ürünleriyle
- Anneden bebeğe (gebelik-doğum ve emzirme sırasında)
- Ortak enjektör, jilet, makas ve diş fırçası kullanımıyla
- Steril olmayan manikür-pedikür seti kullanımıyla
- Korunmasız vajinal, anal ilişki ve oral temasıyla

CYAE nasıl aktarılmaz?

- Hayvan ısırması, arı, sinek, böcek sokmasıyla
- Öpüşme, dokunma, okşama, el sıkışma, sarılma, kucaklama ile
- Tükürük, balgam, gözyaşı, ter, öksürme, aksırma ile
- Ortak yaşam alanı kullanımıyla, aynı evde ve odada yaşamak veya tuvaletlerin ortak kullanımıyla

Güvenli olmayan cinsel davranışlar

En büyük risk kan veya cinsel sıvıların, vajina, penis ucu, anüs, ağız ve burun temasıyla oluşur.

- Korunmasız oral temas
- Korunmasız vajinal ilişki
- Korunmasız anal ilişki
- Korunmasız sürtünme

Güvenli cinsel davranışlar

- Öpüşme
- Kucaklama / Okşama
- Masaj
- Mastürbasyon
- Kondom kullanarak vajinal, oral ve anal ilişki

Cinsel yolla aktarılan enfeksiyonların belirtileri

- Vajina, penis ve anüsten gelen farklı renk, kıvam ya da kokuda akıntı ve bu bölgelerde kaşıntı
- Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı ya da kanama
- Anüs, dış üreme organları veya ağız çevresinde yara, kabarcık, siğil, şişlik ya da yumru oluşması
- Karın alt bölgesinde ağrı ve hassasiyet
- Sık idrara çıkma, idrar yaparken ağrı veya yanma
- Düzensiz adet kanamaları ve nedeni bilinmeyen düşüklükler
- Yüksek ateş, halsizlik, yorgunluk, bulantı ve benzeri genel hastalık belirtileri

CYAE'lerin çoğu tedavi edilebilir enfeksiyonlardır. Ancak bazı enfeksiyonlar belirti vermeden ilerleyebilir. Bu nedenle düzenli hekim kontrolü yaptırmak, herhangi bir belirti durumunda gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurmak, verilen tedaviyi yarım bırakmamak ve eş/partner ile birlikte tedavi olmak enfeksiyonların yönetiminde önemli adımlardır.

HIV ve AIDS

HIV (Human Immunodeficiency Virus) "İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü" olarak adlandırılan, bağışıklık sistemini etkileyen bir virüstür. Tedavi edilmediği durumlarda virüs, bağışıklık sistemini zayıflatarak görevini yerine getiremez hale getirir.

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) "Edinsel Bağışıklık Yetmezliği Sendromu" olarak adlandırılır. AIDS, HIV enfeksiyonunun bağışıklık sistemini ileri derecede zayıflattığı en ileri evredir.

HIV pozitif olan her bireyde AIDS evresi gelişmez!

HIV, vücuda girdikten sonra, kişinin bağışıklık durumuna göre uzun yıllar herhangi bir belirti göstermeden varlığını sürdürebilir. Tedavi edilmediği takdirde HIV, genellikle 10 yıl veya daha uzun bir süre sonunda AIDS evresine ilerleyebilir.

Erken tanı ve düzenli tedavi sayesinde HIV ile yaşayan bireyler, AIDS evresine ilerlemeden sağlıklı ve uzun bir yaşam sürdürebilirler.

Geç tanı alan ve AIDS evresinde olan kişiler dahi ilaç tedavisiyle sağlıklarına kavuşabilmektedirler.

**HIV ile yaşayanlara yönelik ayrımcılık,
bir insan hakları ihlalidir!**



Testler

Korumasız ve riskli bir cinsel ilişkinin ardından HIV bulaşma durumunu değerlendirmek amacıyla çeşitli testler vardır. Bu testlerle kanda antijen veya HIV'e karşı antikor oluşup oluşmadığına bakılır. Test süreci ve sonuçların yorumlanması mutlaka bir uzman danışmanlığında gerçekleştirilmelidir.

ELISA Testi: Ön koldan alınan venöz kan örneğinde HIV antijeni ve/veya HIV'e karşı gelişen antikorların varlığı araştırılan birinci basamak tarama testidir. Pencere dönemi 18-45 gündür. Riskli temastan 45 gün sonra elde edilen negatif sonuç güvenilir kabul edilir.

Hızlı (Rapid) Test: Parmak ucu kan örneği ile çalışılır ve yaklaşık 20 dakika içinde sonuç alınır. GDTM'lerde HIV antijeni ve HIV'e karşı gelişen antikorları birlikte tespit eden HIV Combo hızlı testleri kullanılmaktadır. Pencere dönemi 18-90 gündür. Riskli temastan 3 ay sonra elde edilen negatif sonuç güvenilir kabul edilir.

Doğrulama Testleri: HIV tarama testi pozitif çıktığında, tanıyı kesinleştirmek amacıyla referans laboratuvarlarında uygulanır.

İsminizi ve Kimlik Bilgilerinizi Vermeden de Ücretsiz HIV Testi Yaptırabileceğiniz Merkezler Var.

Türkiye'de HIV testi; devlet ve üniversite hastanelerinde, özel hastanelerde, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM), Göçmen Sağlığı Merkezlerinde ve özel laboratuvarlarda yapılabilmektedir. Ayrıca, ücretsiz ve anonim (kimlik ve isim bilgisi paylaşmadan) HIV testi ve danışmanlık hizmeti sunan Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri (GDTM) de bulunmaktadır. Hizmet verdiği il ve merkez sayıları giderek artan GDTM'lerde, isim ve kimlik numarası paylaşmadan ücretsiz HIV testi yaptırılabilir. GDTM iletişim bilgilerine broşürün son bölümünde yer alan karekod üzerinden ulaşabilirsiniz.

CYAE, T.C. Sağlık Bakanlığı'na bildirimi zorunlu olan bir durumdur. Ancak bu bildirimin amacı kişisel bilgilerinizi toplamak değil; ülke genelinde istatistik oluşturmak ve genel durumu izlemektir. Bu nedenle hastanelerde yaptırılan testler bildirim kapsamındadır. Bildirimler, isim veya kimlik bilgisi kullanılmadan, kodlama yoluyla yapılır ve bilgiler yalnızca Sağlık Bakanlığı ile paylaşılır.

CİNSEL YOLLA AKTARILAN ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

- Genç bireyler;biyolojik, sosyal ve davranışsal faktörlerin etkisiyle HIV ve diğer cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar açısından daha fazla risk altında olabilir. Enfeksiyon geçiş riski, korunmasız temas gibi riskli davranışlarla artar.
- HPV ve Hepatit B için aşı yaptırılarak korunma sağlanır.
- Şırınga, iğne ve dövme aletleri, akupunktur ve kulak delme iğneleri, manikür-pedikür setleri, traş bıçakları-usturalar gibi kesici ve delici aletler her yeniden kullanımdan önce mutlaka dezenfekte edilmeli veya tek kullanımlık materyaller tercih edilmelidir. Bu tür uygulamaların steril koşullarda gerçekleştirildiğinden emin olunmalıdır.
- Makas, jilet, törpü, tırnak makası gibi kesici-delici aletleri ortak kullanılmamalıdır.
- Çıplak deri ile kan temasından kaçınılmalıdır.
- Kondom (kaput, kılıf, prezervatif) kullanmak, cinsel ilişkiye giren kişilerin HIV'den korunmasında en güvenilir yöntemdir. Cinsel ilişkinin her çeşidinde (vajinal, anal, oral) ve her ilişkide kondom doğru bir şekilde kullanıldığında, koruyuculuk en yüksek seviyeye çıkar.
- Su bazlı kayganlaştırıcı, kondomla birlikte kullanıldığında kondomun yırtılma riskini azaltmaya yardımcı olur.
- CYAE taşıyıcısı olan ve tedavi sürecinde olan bireylerin de kondom kullanması gerekmektedir.
- Erken tanı ve tedavi kişinin sağlığına yeniden kavuşmasının yanı sıra enfeksiyonun bulaşmasını da önleyecektir.



Penis kondomu



Su bazlı kayganlaştırıcı

Vajina kondomu



HPV ve Hepatit B için aşı




Kondom kullanımı



- Her cinsel ilişkide kondom kullanın.
- Kullanılmış kondomları asla yeniden kullanmayın.
- Kondomları güneş ışığından, sıcaktan ve nemden koruyun.
- Kondomun son kullanma tarihine dikkat edin. Kullanım süresi geçmiş kondomları kullanmayın.
- Kondomu su bazlı kayganlaştırıcılarla kullanabilirsiniz ama vazelin, bebek yağı ve losyon içeren kayganlaştırıcılar kondoma zarar verebileceği için bunları kullanmayın.
- Kondomu paketinden çıkarırken kesici alet kullanmayın, tırnaklarınızın kondoma zarar vermesinden kaçının.
- Kondomu, cinsel ilişkinin en başında, cinsel sıvılar birbirine değmeden ve penis tam olarak sertleştiği zaman takın.
- Eğer cinsel ilişkinin herhangi bir anında kondomun zarar gördüğünü hissederseniz kondomu hemen değiştirin.

Penis kondomu (prezervatif)

Penis kondomu, vajinal, oral ve anal ilişki kullanıldığında kullanılmalıdır.



- Penis sertleştikten sonra, paketinden çıkardığınız kondomun uç kısmını, içerisinde hava kalmayacak biçimde baş ve işaret parmaklarınız arasında sıkıştırın. Bunun amacı, kondomun içerisinde hava kalmasını önleyerek, sonradan meni sıvısının kondomun içinde birikebilmesini sağlamaktır.
- Kondomun kenarını penis köküne doğru sıvazlayarak, kondomun penisi tümüyle kaplamasını sağlayın.
- Boşalmadan sonra, sertlik kaybolmadan penisi geri çekin. Kondomun dış yüzeyinde kalan, partnerinize ait salgı ve sıvılara çıplak elle temas etmeyin. Kondomu çıkaran kişinin salgının sahibi olması, koruyucu bir önlemdir.
- Kondomu dibinden tutarak çıkarın.
- Kullanılmış kondomu çöpe atın.

Kondom hakkındaki yanlış bilgiler

Kondomun cinsel hazzı azalttığına veya ereksiyon kaybına yol açtığına dair yaygın inanışlar bulunmaktadır. Oysa araştırmalar; uygun boyutta ve doğru şekilde kullanıldığında, kondomun cinsel haz üzerinde belirgin bir olumsuz etkisi olmadığını göstermektedir. Uygun (su bazlı) kayganlaştırıcı kullanımı konforu artırmaktadır. Ayrıca kondom; istenmeyen gebelik ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara karşı koruma sağladığı için olası kaygıları azaltmakta ve cinsel deneyimi daha güvenli bir zemine taşımaktadır.



**“önyargılarımı
yıktım,
kondomumu
taktım!”**

Vajina kondomu

Vajina kondomu, vajinal ve anal ilişki sırasında kullanılır.



- Elastik iç halkayı, baş, işaret ve orta parmaklar yardımıyla sıkıştırın. (Bu şekilde kondomu daraltarak vajinaya girişi kolaylaştırabilirsiniz.)
- Diğer eliniz ile küçük dudakları aralayıp vajina girişinizi bulun ve kondomu vajinaya sokup içeriye doğru ilerletin.
- İki parmağınızı (işaret ve orta parmaklar) vajinaya sokarak iç halkanın mümkün olduğunca derine itilmesini sağlayın. İç halkaya ulaşamıyorsanız, kondom doğru yerdedir.
- Kondomun büyük ve açık olan halkası, vajina girişi etrafındaki iç ve dış dudakları örtecek biçimde serbest kalır.
- İlişki sonrasında kondomu dış halkadan tutup çevirerek çıkarın. İçindekilerin dökülmemesi için, çıkarma işlemini ayağa kalkmadan yapın.

GEBEDEN BEBEĐE HIV GEÇİŐİNİN ÖNLENMESİ

HIV ile yaşıayan kiřiler, gebelik süresince düzenli ve etkili antiretroviral tedavi aldıklarında virüsün bebeĐe geçiř riski %1'in altına düşebilmektedir. Doğum sonrası dönemde de uygun tıbbi izlem ve tedaviyle bu risk en aza indirilmektedir.

Etkili önlemler sayesinde, HIV ile yaşıayan kiřiler HIV negatif bebek sahibi olabilmektedir.




B = B : Belirlenemeyen eşittir Bulaşmayan, U = U

B eşittir B, en az 6 ay HIV ilaçlarını düzenli kullanan ve vücutlarındaki HIV baskılanan bireyler için, virüsün cinsel ilişki yoluyla bulaşmadığı anlamına gelir. Bu ana mesajı bilimsel olarak onaylayan çalışmaların sonuçları ve Belirlenemeyen eşittir Bulaşmayan ifadesi Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS), ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi otoritelerce kabul edilmiştir.

HIV tedavisi ve yeni vakaların önlenmesine yönelik çalışmalar açısından çok önemli bir bilimsel aşama olan B = B, sosyal açıdan da önemli bir mesajdır ve HIV ile yaşayanların maruz kaldıkları damgalama ve ayrımcılıkların da sona ermesini desteklemektedir.

B eşittir B kavramının geçerliliğinden ve sürekliliğinden bahsedebilmek için, HIV ilaç tedavisi gören bireylerin virüs yüklerinin belirlenemeyen seviyeye erişmesi ve ve düzenli ilaç kullanımıyla belirlenemez seviyede kalması gereklidir.

B eşittir B durumunda HIV bulaşma riski ortadan kalksa da, diğer cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlara karşı risk devam eder. Bu nedenle güvenli cinsel yaşam için kondom kullanımına devam edilmelidir.




PrEP: Pre-Exposure Prophylaxis, Temas Öncesi Korunma Tedavisi

PrEP HIV geiř riskini azaltmak iin cinsel temas ncesinde bařvurulan bir tedbir uygulamasıdır. Kendini yksek HIV riski altında gren kiřilere, enfeksiyon hastalıkları uzmanı onayıyla verilir ve yine enfeksiyon hekimi gzetiminde dzenli testlerle srdrlr. nk bu kararı tek bařına almak, gereksiz durumlarda ve gereksiz miktarlarda ila kullanarak, planlanmayan yan etkilere maruz kalmanızla da sonulanabilir.

řu anda dnya genelinde birkaç lkede cretsiz olarak reete edilen PrEP, Trkiye’de cretsiz olarak reete edilmemektedir. Ancak bireyler, ilacı kendi btlerinden karřılayarak PrEP kullanabilirler. Herhangi bir ilacı kullanmadan nce mutlaka doktorunuza danıřmalısınız.

PrEP’in HIV geiřini nlemede yksek dzeyde bařarılı olduėunu ortaya koyan nemli sayıda bilimsel alıřma vardır. Fakat PrEP’in HIV dıřındaki diėer CYAE’ler (cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar) aısından bir koruma saėlamadıėı hatırlanmalıdır. Bu nedenle “ift yntemli korunma” (PrEP + Kondom) en gvenli yaklařım olarak kabul edilir.



TaSP : Treatment as Prevention, Korunma Amaçlı Olarak İlaç Tedavisi

TaSP; HIV tedavisinde kullanılan virüsü baskılayan ilaçların (ART), yeni HIV aktarımlarını önlemedeki etkisine dayanan bir tedavi yaklaşımıdır. HIV tanısı almış bireylerin zaman kaybetmeksizin ilaç tedavisine başlamaları ve tedaviyi düzenli sürdürmeleri, viral yüklerinin belirlenemeyen düzeye ulaşmasını sağlar. Böylece B=B (Belirlenemeyen = Bulaşmayan) ilkesi doğrultusunda HIV'in cinsel yolla aktarımı önlenir.

PEP: Post-Exposure Prophylaxis, Temas Sonrası Korunma Tedavisi

PEP potansiyel riskli temaslardan sonra başvuru, HIV geçişini önleme amaçlı bir yöntemdir. Türkçe'de temas sonrası korunma tedavisi ya da acil durum HIV tedavisi olarak da bilinen bu yöntem, riskli teması takip eden **ilk 72 saat içinde** başlanması gereken bir ilaç kullanımının, 28 gün boyunca kesintisiz olarak devam etmesi şeklinde uygulanır. Virüsün vücutta kalıcı bir enfeksiyon oluşturmamasını engellemek için ne kadar erken başlanırsa o kadar etkilidir. İdeal olan, ilk 24 saat içinde ilk dozu almaktır.

Temasın riskinin büyüklüğüne ilişkin değerlendirme ve PEP uygulamasına ilişkin karar, uzman bir hekim tarafından verilmeli ve uygulama uzman hekim gözetiminde sürdürülmelidir. Türkiye'de PEP tedavisine erişim için hastanelerin enfeksiyon hastalıkları bölümlerine başvurulmalıdır.

PEP'in HIV geçişini önlemedeki koruyuculuğu; riskin büyüklüğü, tedaviye başlama hızı ve tedaviye uyum gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak en üst seviyeye ulaşmaktadır.



BİLİYOR MUSUNUZ?

HIV enfeksiyonu günümüzde kontrol altına alınabilmekte, HIV ile yaşayanlar güçlü ve etkili tedaviler sayesinde uzun yıllar kaliteli bir yaşam sürdürebilmekte, dilerlerse evlenebilmekte ve çocuk sahibi olabilmektedirler.

- HIV tedavisinde, günde bir kez kullanılan tek tablet ilaçlar 2006 yılından bu yana uygulanmaktadır. Türkiye’de ise ilaç ve tedavi hizmetleri sosyal güvenlik sistemi kapsamında ücretsiz olarak sunulmaktadır.
- Dünya genelinde yeni HIV vakalarının önemli bir bölümü genç yaş gruplarında görülmektedir; özellikle 15-24 yaş aralığında yeni enfeksiyonlar yüksektir.
- Türkiye’de ise bu yaş grubundaki gençlerin %55’i HIV’i hiç duymadığını belirtmektedir.

**Ücretsiz ve kimlik bilgilerinizi vermeden HIV testi
yaptırabileceğiniz Gönüllü Danışmanlık ve Test
Merkezlerinden HIV ile ilgili danışmanlık alabilirsiniz.**

Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezlerinin (GDTM) iletişim bilgilerine TAPV Akademi üzerinden, TAPV internet sitesindeki "İletişim>Destek Alınabilecek Kurumlar" başlığından veya aşağıdaki karekod aracılığıyla ulaşabilirsiniz.



- Sağlıklı ve güvenli cinsel yaşam hakkında düşünün.
- Sınırlarınızı belirleyin, partnerinizle paylaşın.
- Vajinal, oral ve anal ilişkide kondom kullanın.
- Cinsel sıvı, kan ve kan ürünleriyle doğrudan temas etmeyin.
- Ortak kesici-delici alet kullanmayın.

Kendinizi ve partnerinizi cinsel yolla
aktarılan enfeksiyonlardan korumak
mümkündür.

Bunun için hangi davranışların risk taşıdığını
bilmeniz ve korunmanız yeterli olacaktır.



Merak ettiklerinizi öğrenmekten kaçınmayın!

TAPV Akademi akademi.tapv.org.tr
TAP Vakfı Cinsel Sağlık Bilgi Hattı:
444 65 39 (Hafta içi 09:00-18:00)





www.tapv.org.tr - info@tapv.org.tr

facebook.com/tapvakfi

twitter.com/tapvakfi

akademi.tapv.org.tr

instagram.com/tapvakfi/

Ahmet Adnan Saygun Cad. K lt r Mah. G zel Konutlar Sitesi A Blok

D: 3-4 34340 Be ikta  /  stanbul

T: 0212 257 79 41 - F: 0212 257 79 43